

Examen de Matemáticas 1º de Bachillerato

Diciembre 2001

Problema 1 (2 puntos) Descompón cada polinomio como producto de factores de grado uno:

1. $P(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2$

Solución:

$$P(x) = (x - 2)(x - 1 - \sqrt{2})(x - 1 + \sqrt{2})$$

2. $Q(x) = 2x^3 - x^2 - 2x + 1$

Solución:

$$Q(x) = (x - 1)(x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

Problema 2 (3 puntos) Calcular las soluciones reales de:

1.

$$\frac{2x - 3}{x - 1} = \frac{3x - 7}{2x - 5}$$

Solución:

$$(2x - 3) \cdot (2x - 5) = (x - 1) \cdot (3x - 7)$$

$$4x^2 - 10x - 6x + 15 = 3x^2 - 7x - 3x + 7$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = \frac{6 \pm 2}{2} \implies x = 4, x = 2$$

2.

$$\frac{2 + x}{x^2 + x} = \frac{2 - x}{x^2 - x}$$

Solución:

$$(2 + x) \cdot (x^2 - x) = (2 - x) \cdot (x^2 + x)$$

$$2x^2 - 2x + x^3 - x^2 = 2x^2 + 2x - x^3 - x^2$$

$$2x^3 - 4x = 0 \implies x \cdot (2x^2 - 4) = 0 \implies$$

$$x = 0 \text{ (No sería una solución lógica)}$$

$$2x^2 - 4 = 0 \implies x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$$

Problema 3 (2 puntos) Halla las soluciones reales de:

$$\sqrt{x+6} + \sqrt{2-x} = 4$$

Solución:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+6})^2 &= (4 - \sqrt{2-x})^2 \\ x+6 &= 16 + (\sqrt{2-x})^2 - 8\sqrt{2-x} \\ 2x-12 &= -8\sqrt{2-x} \\ x-6 &= -4\sqrt{2-x} \\ (x-6)^2 &= (-4\sqrt{2-x})^2 \\ x^2 + 36 - 12x &= 16(2-x) \\ x^2 + 4x + 4 = 0 &\implies x = \frac{-4 \pm \sqrt{16-16}}{2} = -2 \text{ doble} \end{aligned}$$

Problema 4 (3 puntos) Halla las soluciones de:

1.

$$3^{x^2+5x-4} \cdot 9^{2x+3} = 27^{x-1}$$

Solución:

$$\begin{aligned} 3^{x^2+5x-4} \cdot 3^{2(2x+3)} &= 3^{3(x-1)} \\ 3^{x^2+5x-4+2(2x+3)} &= 3^{3(x-1)} \\ x^2 + 5x - 4 + 4x + 6 &= 3x - 3 \\ x^2 + 6x + 5 = 0 &\implies x = \frac{-6 \pm \sqrt{36-20}}{4} \\ x = \frac{-6 \pm 4}{2} &\implies x = -1, x = -5 \end{aligned}$$

2.

$$\log_{10}(3x^2 - 2) = 1 + \log_{10}(x - 1)$$

Solución:

$$\begin{aligned} \log_{10}(3x^2 - 2) &= \log_{10}10 + \log_{10}(x - 1) \\ \log_{10}(3x^2 - 2) &= \log_{10}10(x - 1) \\ 3x^2 - 2 &= 10(x - 1) \\ 3x^2 - 10x + 8 = 0 &\implies x = \frac{10 \pm \sqrt{100-96}}{6} \\ x = \frac{10 \pm 2}{6} &\implies x = 2, x = \frac{4}{3} \end{aligned}$$