

# Examen de Matemáticas 1º de Bachillerato

## Marzo 2005

---

**Problema 1** Calcular la derivada de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$
2.  $f(x) = (x^2 - x + 1)(2x^2 - 1)$

**Solución:**

1.  $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \implies f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$
2.  $f(x) = (x^2 - x + 1)(2x^2 - 1) \implies f'(x) = 8x^3 - 6x^2 + 2x + 1$

**Problema 2** Dada la función  $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 12$ , calcular sus máximos y sus mínimos utilizando el criterio de la segunda derivada.

**Solución:**

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 0 \implies x = 1, \quad x = -5$$

$$f''(x) = 6x + 12 \implies \begin{cases} f''(1) = 18 > 0 \implies x = 1 & \text{Mínimo} \\ f''(-5) = -18 < 0 \implies x = -5 & \text{Máximo} \end{cases}$$

Luego la función tiene un Mínimo en el punto  $(1, 4)$  y tiene un Máximo en el punto  $(-5, 112)$ .

**Problema 3** Resolver

1. Estudiar la continuidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 7 & \text{si } x < 2 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \quad \text{en } x = 2$$

2. Calcular  $k$  de manera que la función

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - k & \text{si } x < 1 \\ kx - 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

sea continua en todo  $R$ .

**Solución:**

1.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2x + 1) = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 7) = 1$$
$$f(2) = 1$$

Luego:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(2) = 1$$

Por tanto  $f(x)$  es continua en  $x = 2$ , es más, es continua en todo  $R$ .

2.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (kx^2 - k) = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (kx - 2) = k - 2$$
$$k - 2 = 0 \implies k = 2$$

**Problema 4** Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 + x^3 - 2x^2 - x + 1}{x^3 + 3x^2 + 9x + 7}$$

**Solución:**

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 + x^3 - 2x^2 - x + 1}{x^3 + 3x^2 + 9x + 7} = \frac{1}{3}$$

**Problema 5** Dada la función

$$f(x) = \frac{(x+1)^2}{x-2}$$

Calcular:

1. Dominio.
2. Puntos de corte con los ejes.
3. Simetrías.
4. Asíntotas.
5. Monotonía.
6. Máximos y Mínimos.
7. Dibujar la gráfica de la función.

**Solución:**

1.  $\text{Dom } f = R - \{2\}$

2. Si hacemos  $x = 0 \implies (0, -1/2)$ . Y si hacemos  $f(x) = 0 \implies (-1, 0)$ .

3.

$$f(-x) = \frac{(-x+1)^2}{(-x-2)}$$

La función ni es par ni impar.

4. • **Verticales:**  $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x+1)^2}{x-2} = \left[ \frac{9}{0^+} \right] = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x+1)^2}{x-2} = \left[ \frac{9}{0^-} \right] = -\infty$$

• **Horizontales:**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{x-2} = \infty \implies \text{No Hay}$$

• **Oblicuas:**  $y = mx + n$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x} - x \right) = 4$$

$$y = x + 4$$

5.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{(x-2)^2} = 0$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \implies x = -1, \quad x = 5$$

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 5)$	$(5, \infty)$
$x + 1$	-	+	+
$x - 5$	-	-	+
$f'(x)$	+	-	+

La función es creciente en el intervalo  $(-\infty, -1) \cup (5, \infty)$ .

La función es decreciente en el intervalo  $(-1, 5)$ .

6. En  $x = -1$  la función pasa de crecer a decrecer, luego estamos ante un máximo, que corresponde al punto  $(-1, 0)$ .

En  $x = 5$  la función pasa de decrecer a crecer, luego estamos ante un mínimo, que corresponde al punto  $(5, 12)$ .

