Examen de Matemáticas 2º de Bachillerato

Mayo 2003

1. Representa gráficamente la curva $y = x + \frac{1}{x}$. Para ello calcula asíntotas, puntos críticos e intervalos de crecimiento.

Solución:

- (a) Calculamos las asíntotas

- **Asíntotas verticales:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{x} = \pm\infty$$

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical.

- **Asíntotas horizontales:**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x + \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x} = \pm\infty$$

Luego no hay asíntotas horizontales.

- **Asíntotas oblicuas:** Si la recta $y = ax + b$ es una asíntota tenemos que

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} - x \right) = 0$$

Luego la recta $y = x$ es una asíntota oblicua.

- (b) Este apartado tiene dos subapartados

- **Extremos relativos:** Para calcularlos recurrimos a la primera derivada y la igualamos a cero

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \implies x^2 - 1 = 0 \implies x = \pm 1$$

Que serían los puntos $(1, 2)$ y $(-1, -2)$

- **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento:** Para calcularlos recurrimos a la primera derivada

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

Tenemos que la función es creciente cuando $f'(x) > 0$ y decreciente cuando $f'(x) < 0$. Como el signo del denominador es siempre positivo, el estudio del signo se reduce al de $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$x - 1$	-	-	+
$x + 1$	-	+	+
$(x - 1)(x + 1)$	+	-	+
	creciente	decreciente	creciente

En el punto $(-1, -2)$ la función tiene un máximo, pasa de creciente a decreciente. En el punto $(1, 2)$ la función tiene un mínimo, pasa de decreciente a creciente.

2. Considera la función la función $f : R \rightarrow R$ definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

- Calcular el dominio de f y puntos de corte si los hay.
- Calcula las asíntotas de la gráfica de f
- Simetrías.
- Determina los intervalos de crecimiento de decrecimiento, y los extremos relativos de f , si existen.
- Dibujar la gráfica de f .

Solución:

- Dominio:** Será el formado por todo R , excepto en aquellos puntos el los que se anule el denominador; $x^2 + 1 = 0 \implies \text{Dom}(f) = R$.

- cortes con el eje OX:** Para ello hacemos $f(x) = 0$

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 0 \implies x^2 - 1 = 0 \implies x = 1, \quad x = -1$$

Luego los puntos de corte son $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.

- cortes con el eje OY:** Para ello hacemos $x = 0 \implies f(0) = -1$, luego el punto de corte es $(0, -1)$.

- Calculamos las asíntotas

- Asíntotas verticales:** No hay ningún valor que anule el denominador de esta fracción y, por tanto, no tiene asíntotas verticales.

- **Asíntotas horizontales:**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

Luego la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal.

- **Asíntotas oblicuas:** Si la recta $y = ax + b$ es una asíntota tenemos que

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2-1}{x^2+1}}{x} = 0$$

Luego no hay asíntotas oblicuas.

- (c) **Simetrías:** Para buscar las simetrías calculamos $f(-x)$:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$$

Luego la función es simétrica respecto al eje OY .

- (d) Este apartado tiene dos subapartados

- **Extremos relativos:** Para calcularlos recurrimos a la primera derivada y la igualamos a cero

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} = 0$$

$$\implies 4x = 0 \implies x = 0, f(0) = -1$$

Sólo queda por decidir si el punto $(0, -1)$ es un máximo o un mínimo, lo cual se verá en el siguiente apartado.

- **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento:** Para calcularlos recurrimos a la primera derivada

$$f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

Tenemos que la función es creciente cuando $f'(x) > 0$ y decreciente cuando $f'(x) < 0$. Como el signo del denominador es siempre positivo el estudio del signo se reduce al de $4x$, que es positivo cuando $x > 0$, y por el contrario, es negativo cuando $x < 0$. En conclusión:

Cuando $x < 0$ la función es decreciente.

Cuando $x > 0$ la función es creciente.

En el punto $(0, -1)$ la función pasa de decrecer a crecer, luego estamos ante un mínimo.

- (e) Con estos datos ya es suficiente para dibujar la gráfica.

Problema nº 1

Problema n°2