

Examen de Matemáticas 2ºBachillerato(CN)

Febrero 2008

Problema 1 Dadas las retas:

$$r : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2} \quad \text{y} \quad s : \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Determinar la posición que ocupan.
- b) Calcular la distancia mínima que las separa.
- c) Encontrar una recta perpendicular a ambas.
- d) Si $P(3, 0, 1)$ encontrar una recta que pasando por P corte a las dos rectas.

Solución:

$$r : \begin{cases} \vec{u_r} = (-1, 1, 2) \\ P_r(1, 0, 1) \end{cases} \quad s : \begin{cases} \vec{u_s} = (-1, 3, -1) \\ P_s(1, -1, 0) \end{cases} \quad \overrightarrow{P_r P_s} = (0, -1, -1)$$

a)

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \implies \text{se cruzan}$$

b)

$$|[\vec{u_r}, \vec{u_s}, \overrightarrow{P_r P_s}]| = 5; \quad |\vec{u_r} \times \vec{u_s}| = \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} \right| = |(-7, -3, -2)| = \sqrt{62}$$

$$d = \frac{5}{\sqrt{62}} = \frac{5\sqrt{62}}{62} u$$

c) $\vec{u_t} = (-7, -3, -2)$

$$\pi_1 : \begin{cases} \vec{u_t} \\ \vec{u_r} \\ P_r \end{cases} \implies \pi_1 : \begin{vmatrix} -7 & -1 & x-1 \\ -3 & 1 & y \\ -2 & 2 & z-1 \end{vmatrix} = 0 \implies 2x - 8y + 5z - 7 = 0$$

$$\pi_2 : \begin{cases} \vec{u_t} \\ \vec{u_s} \\ P_s \end{cases} \implies \pi_2 : \begin{vmatrix} -7 & -1 & x-1 \\ -3 & 3 & y+1 \\ -2 & -1 & z \end{vmatrix} = 0 \implies 9x - 5y - 24z - 14 = 0$$

$$t : \begin{cases} 2x - 8y + 5z - 7 = 0 \\ 9x - 5y - 24z - 14 = 0 \end{cases}$$

d) Tenemos $P(3, 0, 1)$, $\overrightarrow{P_r P} = (2, 0, 0)$ y $\overrightarrow{P_s P} = (2, 1, 1)$

$$\begin{aligned} \pi_1 : \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{P_r P} \\ \overrightarrow{u_r} \\ P_r \end{array} \right\} \implies \pi_1 : \begin{vmatrix} 2 & -1 & x-1 \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 2 & z-1 \end{vmatrix} = 0 \implies 2y - z + 1 = 0 \\ \pi_2 : \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{P_s P} \\ \overrightarrow{u_s} \\ P_s \end{array} \right\} \implies \pi_2 : \begin{vmatrix} 2 & -1 & x-1 \\ 1 & 3 & y+1 \\ 2 & -1 & z \end{vmatrix} = 0 \implies x - z - 1 = 0 \\ h : \begin{cases} 2y - z + 1 = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Problema 2 Sea el plano $\pi : 3x + y - z - 1 = 0$ y la recta $r : \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = 3 \end{cases}$.

Se pide:

- Calcular la ecuación del plano que sea perpendicular a π y contenga a r .
- Calcular la proyección ortogonal de r sobre π .
- El plano π corta a los ejes coordenados en tres puntos que, con el origen, forman un tetraedro. Calcular su volumen y la altura sobre la base formada por los tres puntos de corte.

Solución:

a)

$$\pi_1 : \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{u_\pi} \\ \overrightarrow{u_r} \\ P_r \end{array} \right\} \implies \pi_1 : \begin{vmatrix} 3 & -1 & x-1 \\ 1 & 1 & y \\ -1 & 0 & z-3 \end{vmatrix} = 0 \implies x + y + 4z - 13 = 0$$

b)

$$t : \begin{cases} 3x + y - z - 1 = 0 \\ x + y + 4z - 13 = 0 \end{cases}$$

c) Corte con el eje OX : $y = 0$ y $z = 0 \implies A(1/3, 0, 0)$

Corte con el eje OY : $x = 0$ y $z = 0 \implies B(0, 1, 0)$

Corte con el eje OZ : $y = 0$ y $x = 0 \implies C(0, 0, -1)$

Los vectores con el origen son:

$$\overrightarrow{OA} = (1/3, 0, 0); \quad \overrightarrow{OB} = (0, 1, 0); \quad \overrightarrow{OC} = (0, 0, -1)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{18} u^3$$

Calculamos el área de la base para ello calculamos primero

$$\overrightarrow{BA} = (1/3, -1, 0); \quad \overrightarrow{BC} = (0, -1, -1)$$

$$S = |\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1/3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \right| = |(1, 1/3, -1/3)| = \frac{\sqrt{11}}{6} u^2$$

$$V = \frac{1}{3} Sh \implies h = \frac{\sqrt{11}}{11} u$$