

Examen de Matemáticas II (Junio 2009)
Selectividad-Opción A

Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (3 puntos) Dado el plano $\pi : x + 3y + z = 4$, se pide:

- (1 punto). Calcular el punto simétrico P del punto $O(0, 0, 0)$ respecto del plano π .
- (1 punto). Calcular el coseno del ángulo α que forman el plano π y el plano $z = 0$.
- (1 punto). Calcular el volumen del tetraedro T determinado por el plano π , y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

Problema 2 (3 puntos) Dado el sistema:

$$\begin{cases} 4x + 4\lambda y + 2z = 2\lambda \\ \lambda x + y - \lambda z = \lambda \\ 4\lambda x + 4\lambda y + \lambda z = 9 \end{cases}$$

, Se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema según los valores del parámetro λ .
- (1 punto). Resolver el sistema para $\lambda = -1$.

Problema 3 (2 puntos) Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha x^2 + 4x + 8} \right)^{(x+1)}$$

según los valores del parámetro α

Problema 4 (2 puntos) Calcular la integral:

$$F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t} dt$$

Examen de Matemáticas II (Junio 2009)
Selectividad-Opción B

Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (3 puntos) Dadas las rectas:

$$r : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}, \quad s : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1},$$

se pide:

1. (1 punto). Hallar la ecuación del plano π que contiene a r y es paralelo a s .
2. (1 punto). Determinar la distancia entre las rectas r y s .
3. (1 punto). Estudiar si la recta t paralela a r que pasa por $O(0,0,0)$ corta a la recta s .

Problema 2 (2 puntos) Calcular la siguiente integral

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 3x + 2} dx$$

Problema 3 (3 puntos) Dado el sistema:

$$\begin{cases} 2x - y = \lambda \\ \lambda x - 2y = 4 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$$

1. (2 puntos). Discutir el sistema según los valores del parámetro λ
2. (1 punto). Resolver el sistema cuando sea posible

Problema 4 (2 puntos) Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

se pide:

1. (1 punto). Estudiar el rango de A según los distintos valores del parámetro a .
2. (1 punto). Obtener la matriz inversa de A para $a = -1$