**Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Junio 2014)
Selectividad-Opción A
Tiempo: 90 minutos**

Problema 1 (2 puntos) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calcúlese $(A^t B)^{-1}$, donde A^t denota a la traspuesta de la matriz A .

b) Resuélvase la ecuación matricial $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Solución:

a)

$$A^t B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$
$$(A^t B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

b)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 2x + y = 0 \\ -x = -1 \\ x - 2y = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

Problema 2 (2 puntos) Se consideran la función $f(x, y) = 5x - 2y$ y la región del plano S definida por el siguiente conjunto de restricciones:

$$x - 2y \leq 0, \quad x + y \leq 6, \quad x \geq 0, \quad y \leq 3$$

a) Representétese la región S .

b) Calcúlense las coordenadas de los vértices de la región S y obténganse los valores máximo y mínimo de la función f en S indicando los puntos donde se alcanzan.

Solución:

a) La región S pedida será:

b)

$$\begin{cases} z(0, 3) = -6 & \text{Mínimo} \\ z(3, 3) = 9 \\ z(4, 2) = 16 & \text{Máximo} \\ z(0, 0) = 0 \end{cases}$$

El máximo es de 16 y se alcanza en el punto $C(4, 2)$. El mínimo es de -4 y se alcanza en el punto $A(0, 2)$.

Problema 3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 1 \\ x^2 - 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x + b & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

a) Determinéense a y b para que f sea continua en todo R .

b) Calcúlese $\int_1^3 f(x) dx$.

Solución:

a) Para que f sea continua en $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + a) = 1 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 2) = -1$$

$$1 + a = -1 \implies a = -2$$

Para que f sea continua en $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 2) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + b) = 3 + b$$

$$7 = 3 + b \implies b = 4$$

b)

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 (x^2 - 2) dx = \left. \frac{x^3}{3} - 2x \right|_1^3 = \frac{14}{3}$$

Problema 4 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral tales que: $P(A) = 0,4$; $P(A \cup B) = 0,5$; $P(B|A) = 0,5$. Calcúlense:

a) $P(B)$:

b) $P(A|\bar{B})$.

Nota: $\bar{S}$ denota al suceso complementario del suceso S .

Solución:

a)

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \implies P(B \cap A) = P(B|A)P(A) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \implies P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A) = 0,5 + 0,2 - 0,4 = 0,3$$

b)

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{0,4 - 0,2}{1 - 0,3} = 0,28$$

Problema 5 (2 puntos) La longitud, en milímetros (mm), de los individuos de una determinada colonia de gusanos de seda se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica igual a $3 mm$.

a) Se toma una muestra aleatoria simple de 48 gusanos de seda y se obtiene una media muestral igual a $36 mm$. Determinése un intervalo de confianza para la media poblacional de la longitud de los gusanos de seda con un nivel de confianza del 95 %.

b) Determinése el tamaño muestral mínimo necesario para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral sea menor o igual que $1 mm$ con un nivel de confianza del 90 %.

Solución:

a) Tenemos $\bar{X} = 36$, $\sigma = 3$, $n = 48$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$IC = (\bar{X} - E, \bar{X} + E) = (35,151; 36,849)$$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \frac{3}{\sqrt{48}} = 0,849$$

b) $E = 1, \sigma = 3$ y $z_{\alpha/2} = 1,645$

$$1 = 1,645 \frac{3}{\sqrt{n}} \implies n \simeq 24,35$$

Luego $n = 25$.

**Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Junio 2014)
Selectividad-Opción B**
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ 3x + 4y + 2z = a \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases}$$

a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .

b) Resuélvase el sistema en el caso $a = -1$.

Solución:

a)

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 2 \\ 3 & 4 & 2 & a \\ 2 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right); \quad |A| = a - 3 = 0 \implies a = 3$$

- Si $a \neq 3 \implies |A| \neq 0 \implies \text{Rango}(A) = 3 = \text{Rango}(\bar{A}) = n^\circ$ de incógnitas y el sistema es compatible determinado. (Solución única)
- Si $a = 3$:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right); \quad |A| = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \text{Rango}(A) = 2$$

Como $F_3 = F_2 - F_1 \implies \text{Rango}(\bar{A}) = 2$. Como $\text{Rango}(A) = \text{Rango}(\bar{A}) < n^\circ$ de incógnitas $\implies$ el sistema es compatible indeterminado (infinitas soluciones).

b) Si $a = -1$:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 3x + 4y + 2z = -1 \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \\ z = -1 \end{cases}$$

Problema 2 (2 puntos) Dada la función real de variable real $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 2x$.

- a) Determinése la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.
- b) Calcúlese $\int_2^3 f(x)dx$.

Solución:

a) $f'(x) = 12x^2 - 6x - 2$:

$$b = f(1) = -1, \quad m = f'(1) = 4, \implies y + 1 = 4(x - 1)$$

b) $\int_2^3 f(x)dx = \int_2^3 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx = x^4 - x^3 - x^2 \Big|_2^3 = 41$

Problema 3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^2}{x-2}$$

- a) Determinése sus asíntotas.
- b) Determinése el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .

Solución:

a) Verticales: $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2}{x-2} = \left[\frac{4}{0^-} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2}{x-2} = \left[\frac{4}{0^+} \right] = +\infty$$

Horizontales: No hay

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x-2} = \infty$$

Oblicuas: $y = mx + n \implies y = x + 2$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 2x} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-2} - x \right) = 2$$

b) $Dom(f) = \mathbb{R} - \{2\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2} = 0 \implies x = 0, x = 4$$

	$(-\infty, 0)$	$(0, 4)$	$(4, \infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$	creciente ↗	decreciente ↘	creciente ↗

La función es creciente en el intervalo $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ y decrece en el intervalo $(0, 2) \cup (2, 4)$. La función tiene un mínimo relativo en el punto $(4, 8)$ y un máximo relativo en el punto $(0, 0)$.

Problema 4 (2 puntos) Se dispone de un dado cúbico equilibrado y dos urnas A y B . La urna A contiene 3 bolas rojas y 2 negras; la urna B contiene 2 rojas y 3 negras. Lanzamos el dado: si el número obtenido es 1 ó 2 extraemos una bola de la urna A ; en caso contrario extraemos una bola de la urna B .

- a) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola roja?
 b) Si la bola extraída es roja, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la urna A ?

Solución:

a)

$$P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{15}$$

b)

$$P(A|R) = \frac{P(R|A)P(A)}{P(R)} = \frac{3/5 \cdot 1/3}{7/15} = \frac{3}{7}$$

Problema 5 (2 puntos) El consumo mensual de leche (en litros) de los alumnos de un determinado colegio se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 3$ litros.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene el intervalo de confianza $(16, 33; 19, 27)$ para estimar μ , con un nivel de confianza del 95 %. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.
- b) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 64. Calcúlese el error máximo cometido en la estimación de μ mediante la media muestral con un nivel de confianza del 95 %.

Solución:

- a) $(16, 33; 19, 27) \implies \bar{x} = 17, 80, E = 1, 47$ como $z_{\alpha/2} = 1, 96$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies 1, 47 = 1, 96 \frac{3}{\sqrt{n}} \implies n = 16$$

- b) Tenemos $z_{\alpha/2} = 1, 96$ y $n = 64$:

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1, 96 \frac{3}{\sqrt{64}} = 0, 735$$